


---

## Modalità di raccolta Feci per Calprotectina e/o Elastasi pancreatica

### Esame Calprotectina e/o Elastasi pancreatica

Contenitore Provetta di raccolta per la ricerca Calprotectina e/o Elastasi pancreatica con apposito conservante (vedi immagine).

**N.B.** controllare che sulla provetta di raccolta del campione fecale ci sia scritto “EasyCAL Turbo”, conservare in frigorifero sino al momento dell’uso.



**Preparazione Paziente:** In caso di dosaggio dell’Elastasi pancreatica può essere necessario sospendere la terapia sostitutiva con enzimi pancreatici prima di eseguire il test.

In caso di dosaggio della Calprotectina non è necessario seguire alcuna dieta particolare prima di eseguire il test.

Il test non è eseguibile durante il periodo mestruale o se è presente una patologia emorroidaria.

**Modalità di raccolta** Emettere le feci su una superficie asciutta e pulita. Evitare di contaminare le feci con le urine o altri liquidi. Svitare il tappo del flacone, fare attenzione a non rimuovere la parte blu, senza vuotare il contenuto, estrarre il bastoncino e strisciare la parte terminale tre o quattro volte in punti diversi del campione fecale. E’ sufficiente prelevare una piccola quantità di feci. Rimettere il bastoncino nel flacone con la soluzione conservante, chiudere bene il contenitore avvitando il tappo e agitare lentamente.

**Conservazione** Il campione prelevato deve essere conservato in frigorifero se non si consegna in giornata.

E’ consigliato trasportare il campione in Laboratorio a temperatura controllata (4°C).

Consegnare il campione entro e non oltre tre giorni dalla raccolta.

**Note** I contenitori si ritirano gratuitamente presso l’Accettazione del Laboratorio.

MOD. M46 LABSS